

DEZEMBRO

Dezembro 2014

| S | T | Q | Q | S | S | D |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |

Sementeira de hortaliças:

Aipo.
Alhos.
Alho-porro.
Alfaves para Inverno.
Beterraba p/ salada.
Cebolas.
Cebolinhas para conserva.
Chicórias.
Couves diversas, excluindo-se
Brócolos e Couve-flor.
Coentros.
Ervilhas diversas.
Espinafres de grão áspero.
Nabos.
Salsa.
Nabiças.
Rabanetes.

Sementeira de flores: (Sementes)

Cíclames.
Ervilhas-de-cheiro
Malvaísicos.
Paciências

(Bolbos)

Ranúnculos.
Túlipas.
Jacintos.
Íris.
Anémonas.
Narcisos.
Sparaxias.
Gipsofilas.

Plantam-se igualmente: Alcachofras, Tupinambos, Espargos e Morangueiros.

Semeiam-se igualmente: Frutas de árvores de caroço caíam-se os troncos das árvores de fruto e procede-se á poda e desinfeção das mesmas.

SE QUERES UM BOM ALHAL, PLANTA-O NO MÊS DO NATAL.

ALHOS

Perde-se no tempo o cultivo dos alhos sendo que, já são cultivados há milhares de anos e utilizados na culinária nas suas mais variadas vertentes. A sua popularidade tem vindo a aumentar graças a um maior conhecimento das suas propriedades benéficas para a saúde dos humanos, principalmente no que toca à prevenção de doenças do foro cardíaco.

Cultura - Os alhos preferem terrenos bem drenados e ricos em matéria orgânica. Os solos arenosos e leves possuem a textura ideal para o cultivo de alhos. Antes da plantação dos 'dentes de alho' no solo, este deve ser bem cavado e trabalhado, a fim de ficar suficientemente solto para proporcionar as condições ideais ao desenvolvimento da planta. Os dentes de alho são geralmente



plantados no outono, entre outubro e dezembro, isto porque a planta requer as baixas temperaturas e os dias curtos de Inverno para auxiliar o desenvolvimento das suas raízes. Na primavera as plantas começam a apresentar um desenvolvimento mais rápido, começando a apresentar a formação da chamada 'cabeça de alho' sendo neste período a fase mais crítica no que se refere ao seu apodrecimento se for regado de forma excessiva. Em maio ou junho a planta começa a mudar de verde para um tom seco sem clorofila, o que denota o seu amadurecimento. São então arrancados sendo que se lavados de imediato e escovados ficam com melhor aspeto visual, podendo depois de completamente secos (à sombra) ser enrestados para guardar-se dependurados.

ERVILHAS



Semeiam-se de outubro a março em lugar definitivo

A finalidade da cultura é a produção de frutos para consumo em verde. A ervilha é um produto hortícola que tem um largo consumo na alimentação humana. Em verde e sob a forma de vagem é usada para saladas frias, sopas, guisados, etc. Em grão é usada para os mesmos fins sendo um alimento nutritivo e de fácil digestão.

Sementeira – A sua reprodução faz-se em local definitivo, existindo variedades que vão das anãs às de estacar dado o seu porte em altura. São plantas que não gostam de passar secas estivais, preferindo por isso as regiões temperadas. Gostam de terrenos silicoargilosos, com bastante luz e arejados. Gostam de terrenos leves, ricos em composto e com presença de calcário, rejeitando os secos ou os excessivamente húmidos.

Adução – É uma planta exigente gostando de Potássio e Fósforo, podendo-se adicionar ao estrume que se incorporou na cava da cultura, anterior cinzas de madeiras. As ervilhas são extremamente doces pelo que são comumente atacadas por algumas borboletas que ai depositam os seus ovos que quando sob a forma de lagartas furam as sementes verdes ainda dentro da vagem.

Nunca se desfaça das embalagens vazias de fitofármacos na natureza. Nunca queime as embalagens de produtos fitofarmacêuticos. Nunca reutilize embalagens vazias desses mesmos produtos.