



O serranito
almanaque
2014



EBI/JI Prof. Dr. Ferrer Correia

Calendário 2014

| JANEIRO | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |

| MARÇO | | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |

| MAIO | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| JULHO | | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |

| SETEMBRO | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |

| NOVEMBRO | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| FEVEREIRO | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|----|----|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |

| ABRIL | | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |

| JUNHO | | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |

| AGOSTO | | | | | | |
|--------|----|----|----|----|----|----|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |

| OUTUBRO | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |

| DEZEMBRO | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|
| S | T | Q | Q | S | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |

Feriados e Festividades

1 janeiro – Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus
 4 março – Carnaval
 18 abril – Sexta-feira Santa
 20 abril – Domingo de Páscoa
 25 abril – Dia da Liberdade
 1 maio – Dia do Trabalhador
 10 junho – Dia de Portugal

19 junho – Corpo de Deus (1)
 15 agosto – Assunção de Nossa Senhora
 5 outubro – Implantação da República(1)
 1 novembro – Dia de Todos os Santos (1)
 1 dezembro – Restauração da Independência (1)
 8 dezembro – Imaculada Conceição (1)
 25 dezembro – Natal

(1) Feriado Suspenso

janeiro

“No quarto minguante de janeiro, o agricultor corta o madeiro.”



O que se deve semear ou plantar:

Semear: Fava, ervilha, alface, rabanetes, couve-flor, brócolos, repolho, cebola, cenoura. Nos terrenos enxutos, já se pode semear sécias, zínias, papoulas, goivos, girassóis, miosótis e todas as plantas anuais ou de estação.

Plantar: árvores de fruto e, se possível, a batata precoce.
Planta-se quase tudo neste mês.

O que se deve colher:

Colher: couves, espinafre, entre outras.

Nos jardim, colher violetas, amores-perfeitos, camélias, jacintos, tulipas, entre outras.

Outros trabalhos:

Preparar os canteiros, talhões e leiras, cuja terra deverá ficar muito limpa, fofa e sem torrões. Como neste mês são frequentes as geadas, as plantas devem ser cobertas de noite com esteiras, giestas, urzes, etc.

Cavar os pomares de modo a não ofender as raízes.

Arrancar as árvores decrépitas e pouco produtivas, e substituí-las por outras de boa qualidade e sãs;

Limpar e raspar os troncos e pernas principais das árvores fruteiras dos musgos e líquenes. Enxertia de garfo nas amendoeiras.

Preparação de todas as culturas do Inverno e das terras para batatal.

Para evitar quaisquer possibilidades de alagamento ou encharcamento deve manter-se em estado de eficiência a rede de drenagem de terrenos.

Quem ainda não podou as roseiras não deve deixar de o fazer agora.
Deve também adubar bem os jardins.

Quem ainda não podou as roseiras não deve deixar de o fazer agora, convindo também adubar bem os jardins, sem o que não pode obter-se flores.

Mergulhar vide, podar e meter bacelo. Limpar as cepas até às raízes principais, descascando-as à mão ou com raspadores apropriados, as quais devem, em seguida, ser pinceladas ou pulverizadas com caldas ferro-cálcidas ou oleosas, indicadas para o efeito.

Desinfectar (com produtos apropriados) as videiras que foram atacadas pela fumagina ou pelo algodão.

Vigiar os vinhos novos, acompanhando a evolução da sua acidez volátil e trasfegando os que ainda se encontram com borras. As vasilhas com vinhos devem estar completamente cheias e bem arrolhadas.

Abrigam-se as galinhas do frio e da humidade, mantendo-se o solo das capoeiras seco e limpo. Excitam-se-lhes a postura dando-lhes aveia e trigo sarraceno.


Vacinar o gado bovino, cavalariço, ovino e caprino, além dos porcos contra as doenças rubras.

Embalagens Valorfito a recolher:

O que é o Valorfito?

O Valorfito surgiu perante a necessidade dos produtores agrícolas em encontrar um destino adequado para os resíduos de embalagens de produtos fitofarmacêuticos gerados. Valorfito é o sistema gerido pela Sigeru, Lda. - Sistema Integrado de Gestão de Embalagens e Resíduos em Agricultura, tem como objetivo a recolha e valorização dos resíduos de embalagens de produtos fitofarmacêuticos.

O sistema VALORFITO recolhe as embalagens primárias de produtos fitofarmacêuticos, ou seja, as embalagens que estão em contacto direto com os produtos fitofarmacêuticos, classificadas como resíduos perigosos.



fevereiro

“Neve em fevereiro, é sinal de mau celeiro.”



O que se deve semear ou plantar:

Semear: abóboras, acelgas, alface, alho-francês, beterraba, cebolas, cenouras, coentros, couve-flor serôdia, couve-de-grelos, espargos, ervilhas, espinafres, favas, feijão, malaguetas, melancia, nabiças, nabos serôdios, pimentos, repolho, salsa, tomate, tronchudas.

Semear também cereais de Inverno e Primavera - aveia, centeio, cevada e trigo.

Semear todas as flores anuais: cíclames, chagas, cólios, cosmos, ervilhas-de-cheiro, espargos, gipsofilas, manjericos, sécias, etc.

Plantar: batata.

O que se deve colher

Colher couves e cebolas, cenouras, salsa, espinafres, couve-flor e brócolos.

Colher amores-perfeitos, violetas, etc.

Outros trabalhos:

Cavar, ou lavrar a fundo, os terrenos que estejam livres e em bom estado de enterrar estrumes e adubos fosfatados. Para a sementeira de melões, pimentos e tomateiros, preparar camas quentes.

Iniciar o tratamento das macieiras, pereiras e pessegueiros contra as cochonilhas, ovos de insetos e de ácaros e formas hibernantes de pedrado.

Pulverizar com calda bordalesa as nespereiras (contra o pedrado), os pessegueiros (contra o crivado e a lepra) e outras fruteiras - laranjeiras, etc. (contra o míldio).

Prosseguimento da preparação das terras - lavouras, gradagens, adubações, estrumações, etc. - destinadas às culturas da Primavera.

Sachar ou mondar os ervilhões e os favais; exterminar as ervas daninhas dos prados ou dos lameiros.

Execução de caldeiras em volta das árvores e arbustos, onde se lança estrume que não deve ficar em contacto com as plantas (este estrume é coberto com terra na Primavera).

Prosseguir com as fertilizações iniciadas no mês anterior. Reparar bardos, lateiros e ramadas, substituindo ou endireitando os esteios e esticando ou consertando os arames.

Iniciar a enxertia, utilizando castas apropriadas, nos locais abrigados. Cortar as raízes que surjam por cima da soldadura do enxerto.

Cavar, ou lavar a fundo, os terrenos que estejam livres e em bom estado de enterrar estrumes e adubos fosfatados.

Trasfegar os vinhos que não devem ser conservados mais tempo sobre as borras, isto é, na "mãe". Corrigir os vinhos defeituosos. Atestar as vasilhas mal cheias. Manter a adega sempre limpa, caiando-a de tempos em tempos com leite de cal, a que se junta uma pequena quantidade de sulfato de cobre.

Um suplemento de rações com farinha, amendoim, linhaça, etc., deverá ser fornecido às vacas leiteiras. Vacinar os cães contra a raiva.

Embalagens Valorfito a recolher:

Ao longo do ano terá de proteger as suas culturas contra vários tipos de problemas que podem levar à quebra da produção – pragas, doenças e infestantes - e, por isso, recorrerá a vários tipos de produtos farmacêuticos, designados por, pesticidas, tais como: Fungicidas - para fungos; Inseticidas - para insetos; Acaricidas - para ácaros; Herbicidas - para ervas infestantes; Nematocidas - para nemátodos Moluscicidas - para lesmas e caracóis; Rodencidas - para ratos; Algicidas - para algas; Bactericidas - para bactérias; Adjuvantes - substâncias que se adicionam às caldas e lhes imprimem certas propriedades.

Adquira os produtos necessários para cada mês no ponto de venda e um saco da dimensão mais adequada às suas necessidades (50L, 115L ou 600L). O primeiro saco é pago, apenas como caução, e quando entregar o saco cheio pode solicitar um novo, gratuitamente.

Os seus Centros de Recolha Valorfito mais próximo são:

Cooperativa Agrícola de Miranda do Corvo

3220-202 Miranda o Corvo - Tel.: 239 532 130

Em Campo Consigo No Mundo Rural, Lda

3220-426 Semide -Tel.: 96 253 83 54

março

“Março marçagão, de manhã
Inverno, de tarde Verão”



O que se deve semear ou plantar:

Semear: milho, trigo de primavera, cevada, luzerna e outras forragens, linho, abóboras, alfaces, beterraba, cenouras, ervilhas, espinafres, feijões, melancias, melões, nabiças, rabanetes, salsa, tomates e pepinos, arroz, aveia, centeio, cevada, milho temporão, trigo tremês, legumes e forragens, papagaios, sécias, cravos, ervilhas-de-cheiro, dalias, perpétuas, goivos, etc...

Plantar ou transplantar: batatas, cebolas, couves e espargos.

O que se deve colher:

Colher batata do cedo, manjerico, couve- repolho, acelga, cebola, alface, pimento, tomate, alho-porro, aipo, curgete.

Colher as flores de tulipas serôdias, campainhas brancas, narcisos, e goivos.

Outros trabalhos:

Continuar os trabalhos iniciados em Fevereiro, nomeadamente os respeitantes a adubações, correções, lavras e cavas, preparando-se os terrenos para as sementeiras e plantações para o presente mês e seguinte.

De preferência regar pela manhã, caso se verifique falta de água por escassez de chuvas, os talhões onde se efetuaram as sementeiras.

Proceder, se o tempo o permitir, às primeiras sachas das alfaces, alhos e outras culturas em desenvolvimento.

Continuar, nos pomares de macieiras e pereiras, com os tratamentos contra as cochonilhas, ovos de insetos, ácaros e formas hibernantes de pedrado.

Aplicar às fruteiras cítricas emulsões oleosas depois da floração.

Concluir a poda das fruteiras de pevide e das figueiras, e adiantar as de espinho.

Adubar as diversas fruteiras.

Pulverizar as laranjeiras com cal em pó ou ainda em leite.

Proteger os pessegueiros contra a lepra e crivado por meio de pulverizações preventivas com calda bordalesa.

Concluir a preparação das terras para as próximas sementeiras e plantações, incorporando os fertilizantes e os corretivos mais convenientes.

Conclusão da poda nas zonas mais frias e nas regiões mais atreitas a geadas tardias. Prosseguir as enxertias com as castas mais apropriadas, recorrendo às coleções oficiais por oferecerem garantias para a obtenção de garfos.

Combate às nóctuas e aos pulgões com os produtos químicos indicados para o efeito.

Início dos tratamentos contra o míldio e o oídio com sulfato de cobre e enxofre.

Conclusão, na adegas, das trasfegas, aproveitando o tempo seco e sem grandes variações de temperatura.

Prosseguir com o engarrafamento dos vinhos.

Substituição gradual, nos estábulos, do tipo de alimentação de Inverno por verduras, que não devem ser dadas molhadas.

Embalagens Valorfito a recolher:

Todo o agricultor deve recolher e armazenar devidamente as embalagens do sulfato de cobre e da cal utilizadas no tratamento de algumas árvores de fruto e guardadas nos sacos de recolha, sempre que o seu tamanho o permita, para entrega posterior num Centro de Receção Valorfito. Solicite o seu saco.

Relativamente às embalagens Valorfito nunca:

- se desfaça das embalagens vazias de forma descuidada
- deite as embalagens vazias nos campos (terrenos de cultura ou incultos), nos rios, ribeiros ou valas e nos contentores de resíduos urbanos
- queime as embalagens de produtos fitofarmacêuticos;
- reutilize as embalagens vazias de produtos fitofarmacêuticos, pois podem conter resíduos de produto.



abril

“Abril frio e molhado enche o celeiro e farta o gado.”



O que se deve semear ou plantar:

Semear: abóbora, alface, chicória, couve-galega, espinafre, ervilha, feijão, melancia, melão, nabiças, pepino e rabanete.

Plantar: fruteiras de espinho (laranjeiras, limoeiros, etc), andorinhas, begônias, dalias, gladiólos, jarros amarelos, mantendo-se o terreno mais ou menos humedecido, mas sem excesso. Plantar também a relva no jardim.

Plantar ou transplantar: alface, batata, cebola, chicória, couves, pimentos e tomates.

O que se deve colher:

Colher manjerico, couve-repolho, cebola, alface, pimento, tomate, alho-porro, aipo e curgete.

Colher as flores dos lilases, margaridas, etc.

Outros trabalhos:

Sachar, mondar e, se necessário, regar, de preferência nas primeiras horas da manhã. Defender a horta dos ataques dos insectos e das lesmas com pesticidas apropriados.

Enxertar diversas fruteiras e aplicar bons unguentos, que facilitam o pegamento; inspecionar as ligaduras dos enxertos feitos anteriormente.

Proceder a esladroaremos, principalmente nas fruteiras novas e nos enxertos executados anteriormente. Terminar a poda dos citrinos, por vezes limitada à supressão dos ramos secos e dos ladrões mal implantados. Desbotoar os pessegueiros assim que os botões medirem 2-3 centímetros.

Pulverizar contra o pedrado das macieiras, contra lapas e escamas dos citrinos, contra os atídeos, piolhos, pulgões e outros insectos.

Proceder à preparação das terras destinadas às próximas sementeiras.

Para aceleração das ervas daninhas devem-se lavar e gradar as terras de pousio.

Concluir a poda das roseiras.

Aparar as sebes e a relva que esteja em pleno desenvolvimento.

Melhorar os solos compactos incorporando-lhes terriços e restos de folhas. Sachar e adubar os talhões das roseiras que se mostrem enfraquecidos.

Proceder à adubação das vinhas cansadas. Proceder aos respectivos tratamentos contra o míldio, oídio e outros inimigos das videiras.

Concluir, em tempo seco e calmo, as trafegas, as colagens e os engarrafamentos dos vinhos e das aguardentes e prosseguir na vigilância às vasilhas, evitando os vazios que se preencherão com gás sulfuroso ou com atestos. Manter limpos os materiais e utensílios existentes na adega, a qual, sobretudo se o tempo decorrer húmido, deve ser arejada nas horas de sol para evitar o aparecimento e proliferação de bolores.

Especiais cuidados na higiene das vacas leiteiras; separar os vitelos das mães.


Vacinar os porcos contra o "mal rubro".

Embalagens Valorfito a recolher:

Utilização de produtos fitofarmacêuticos:

Antes da utilização de qualquer produto fitofármaco, deve tentar conhecer o tipo de praga ou doença que está a afetar a plantação. Para além disso deve sempre pedir a orientação de um técnico da Câmara Municipal.

Coloque sempre a hipótese de adotar métodos biológicos em substituição de químicos. Nunca se deve utilizar produtos fitofármacos fora de validade.



maio

“Maio chuvoso faz o ano formoso.”



O que se deve semear ou plantar:

Semear: cânhamo, feijão, milho, pensos para o gado, trigos, etc. Prosseguem as sementeiras periódicas (quinzenais) de feijão (para colher em vagem) e de ervilhas. Assim se consegue ter feijão verde e ervilhas durante alguns meses.

Semeia-se ainda algumas plantas de jardins, como cinerárias, gotas de sangue, amarantos, begónias, canas floríferas, chagas, sóleos, couves frisadas, cravos, goivos, glicínias, gerânios, heliantos, malvaíscos e as demais semeadas nos meses anteriores.

Plantar: açafraão, arroz, batata, beterraba, couve galega, melancia, melão, pimento, tomate e fruteiras de espinho, cujo pegamento é agora mais rápido e garantido, desde que não falte a água.

O que se deve colher:

Iniciar a colheita da fava. Colher manjerico, couve-repolho, cebola, alface, pimento, tomate, alho-porro e aipo.

Colher flores para semente.

Outros trabalhos:

Monda-se, sacha-se e rega-se os alfobres. Rega-se as hortas de preferência à tardinha, para que a terra conserve por mais tempo a água absorvida e ser mais facilmente aproveitada pelas plantas.

Prosseguir com os tratamentos preventivos e curativos contra as doenças e pragas das diversas fruteiras: pedrado das macieiras e pereiras, lepra dos pessegueiros, etc.

Sacham-se os campos de milho e os batatais, assim como as sementeiras e plantações de girassol, feijão e soja. Sachar sempre que as ervas daninhas o justifique.

Pulverizar batatais e tomates com caldas cútricas, para evitar o aparecimento do míldio. Defender os feijoads e os meloads contra o piolho.

Mondar e sachar trigo de Primavera.

Enxofram-se as roseiras, por causa do oídio, e mondam-se os botões para obter flores mais perfeitas. Combate-se o piolho das roseiras e doutras plantas de jardins, com insecticidas de contacto.

Neste mês expõe-se ao ar livre as plantas guardadas em estufas e abrigos e semeia-se os cravos que hão-de ser transplantados em setembro.

Continuam os tratamentos contra o míldio e o oídio, devendo prestar-se a maior atenção a qualquer elevação de temperatura acompanhada de humidade, que pode provocar rápido desenvolvimento de fungos.

Proceder à trasfega dos vinhos com depósito. Manter as vasilhas atestadas para impedir que o vinho azede. Determinar a acidez volátil dos vinhos, para verificar se há necessidade de qualquer correção.

Castrar os bezerras, porcos e cordeiros. Tosquiar as ovelhas.

É o melhor mês para a criação de coelhos.

Embalagens Valorfito a recolher:

Reciclagem dos resíduos de embalagens de produtos fitofarmacêuticos

Quando utiliza produtos fitofarmacêuticos tem de ter consciência das suas responsabilidades de modo a dar o devido tratamento e encaminhamento aos resíduos de embalagens de produtos fitofarmacêuticos.


Para além da aquisição dos sacos destinados à recolha das embalagens no ponto de venda, deverá:

- Seguir os procedimentos inscritos no rótulo relativos à limpeza das embalagens;

- Colocar os resíduos das embalagens nos sacos fornecidos para o efeito e armazená-los temporariamente em condições ambientalmente adequadas;


- Entregar nos centros de recepção autorizados os sacos com os resíduos de embalagens de produtos fitofarmacêuticos;

- Solicitar um comprovativo da entrega dos seus resíduos, o qual atestará o cumprimento das boas práticas ambientais.



junho

“Se o vento bailar na noite de S. João, tarda o Verão.”



O que se deve semear ou plantar:

Semear: alface, chicória, feijão, nabiças, rabanete e do milho.

Plantar ou transplantar: alface, chicória, couve galega.

Plantar nas terras fundas batata.

O que se deve colher:

Colher: alface, batata, chicória, couves, espinafres, nabiças e rabanetes.

Arrancar a batata plantada em fevereiro/março, depois de principiar o amarelecimento da rama, e os tubérculos arrancados devem ficar espalhados por algum tempo sobre a terra para enxugarem bem e, só depois, serão conduzidos para lugar fresco, ventilado e que receba pouca luz.

Terminar a colheita da ervilha, favas e grãos.

Ceifa, no Minguante, da aveia e centeio

Colher alface, alho-porro e aipo.

Colher cerejas e as nêspas.

Outros trabalhos:

Prosseguir com a preparação dos canteiros - regas, sachas, mondas, incorporação de estrumes, etc.


Defender contra as seguintes pragas e doenças das fruteiras:

- pedrado das pereiras com caldas apropriadas;

- lepra do pessegueiro, lapas, escamas e cochonilhas com emulsões oleosas de Verão;

- piolhos ou pulgões com caldas nicotinadas e outras apropriadas;

Sachar batatais e milheirais, fazendo já a amontoa da batata e do milho do sequeiro.



Sulfatar batatais e tomatais com caldas cúpricas ou de fungicidas orgânicas de síntese.

Podar os arbustos de floração primaveril.

Cortar os caules às plantas que já floriram.

Regar, mondar e sachar intensamente.

O mês de junho é um dos meses mais críticos para a vinha do ponto de vista da sua sanidade. O míldio, se ataca, pode destruir a produção pela invasão dos cachos, que faz cair e abortar. E o oídio se o tempo é favorável, não mais os abandona até que pinta o bago. A calda cúprica ou as caldas de fungicidas orgânicas de

síntese continuam a aplicar-se preventivamente; o enxofre usa-se curativamente, quando o oídio se manifesta.

O esladramento deve proceder a desfolha, porque às vezes a eliminação de um ladrão, ou mamão basta para evitar o corte das folhas; os ladrões não aproveitados para formar varas de poda, são quebrados normalmente com o polegar e o indicador, e nunca esgarçados.

Deve manter-se a adega limpa e arejada; se o tempo aquecer é recomendável o arejamento durante a noite. Conservar as vasilhas atestadas, recorrendo a vinhos que não alterem a qualidade dos envasilhados.

Embalagens Valorfito a recolher:

A limpeza das embalagens traz benefícios:

- Económicos: Uma embalagem não lavada pode conter até 5% do produto;
- De eficácia: Ao lavar as embalagens utiliza a totalidade do produto e ganha em eficácia no tratamento;
- De segurança: Uma embalagem bem lavada não contém resíduos, evitando assim intoxicações e outros acidentes.
- De ambiente: a embalagem não contamina o ambiente.

Utilização segura de produtos fitofarmacêuticos:

Os trabalhadores devem sempre utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) aquando a aplicação de produtos fitofármacos.

julho

“Em julho ceifo o trigo e o
debulho e com o vento
soprando o vou limpando.”



O que se deve semear ou plantar:

Semear: acelgas, agriões, alface de Outono e Inverno, beldroegas, brócolos tardios, cenouras, chicória, couve-de-bruxelas, couve-nabo, couve-flor tardia, ervilhas, feijão (de trepar e anão), nabo, rabanetes, repolho de Inverno, salsa, amores-perfeitos, calêndulas, cinerárias, etc., bem como as plantas bienais e vivazes de demorada germinação, para serem transplantadas e dispostas no Outono.

O que se deve colher:

Mês da ceifa e da debulha, como principal atividade.

Terminar a colheita da batata temporã e começar ou acabar a destinada a semente.

Colher no final do mês os aipos.

Extrair o mel e a cortiça.

Colher os morangos.

No jardim, colher as primeiras sementes.

Outros trabalhos:

As regas são de grande importância neste período, e devem ser efectuadas à tarde e de acordo com as necessidades das plantas.

Continuar com a defesa contra o pedrado das macieiras, nespereiras e pereiras.

Continuar o combate à formiga em todas as fruteiras e ao bichado das macieiras e pereiras.

Vigiar os enxertos feitos anteriormente, procedendo, sempre que necessário, a esladroamentos.

Regar e manter limpos de ervas, por sachas superficiais, os pomares de espinhos.

Pulverizar com caldas cúpricas os batatais mais atrasados, a fim de evitar ataques de míldio, tão prejudiciais ao desenvolvimento e conservação dos tubérculos.

Imediatamente à colheita, os canteiros devem ser lavrados preparando-os para as plantas de Outono.

Sachar e regar os meloais, milhoais, roçar matos para estrume.

Às roseiras cortam-se as rosas murchas, que desfeiam e enfraquecem as plantas.

Aparar, sachar e mondar as relvas, as quais precisam de ser regadas abundantemente (2 ou 3 vezes por dia).

Ainda se fazem enxofras e sulfatadas, efectuadas consoante as necessidades.

Se além do calor próprio da época também caírem chuviscos, ou houver névoas, as curas repetem-se amiudadas vezes.

Desfolhar em volta dos cachos, não deixar que estes fiquem expostos à incidência direta dos raios solares.

Empar os bardos nas ramadas ou latadas, não cortar as pontas das varas para não comprometer a atividade das videiras.

Iniciar a preparação dos equipamentos e produtos indispensáveis às próximas vindimas e ao fabrico do vinho.

Atestar o vinho e arejar a adega, mas evitando a entrada da luz solar.

Tosquiar os rebanhos laníferos.

Atenção à higiene nas pocilgas.

Embalagens Valorfito a recolher:

Estão abrangidas pelo sistema as embalagens primárias com capacidade inferior a 250 L ou 250 Kg e de acordo com o tipo de embalagem, há vários procedimentos:

Procedimento para embalagens primárias de capacidade <250lt/kg:

Estas embalagens devem ser submetidas à tripla lavagem e inutilizadas. O utilizador final deverá guardar as embalagens nos sacos de recolha, para entrega posterior num Centro de Receção Valorfito.

Procedimento para embalagens rígidas de capacidade entre 25l/kg e 250l/kg (Ex: bilha, bidão, tambor etc.):

Estas embalagens devem ser devidamente esgotadas do seu conteúdo e inutilizadas sem lavagem prévia. As embalagens devem ser guardadas nos sacos de recolha, sempre que o seu tamanho o permita, para entrega posterior num Centro de Receção Valorfito.

agosto

“Em Agosto toda a fruta tem gosto.”



O que se deve semear ou plantar:

Semear: acelgas, agriões, alface, beldroegas, cebolas, cenouras, couve-nabo, espinafres, favas, feijão, nabo, rabanetes, ervilhas, repolho de Inverno, salsa e fruteiras de caroço.

Em estufa podem semear-se ervilhas e feijão, para abrigar as plantas após os primeiros gelos..

O que se deve colher:

Recolha de muitas sementes, que deverão ser bem selecionadas para evitar as hibridações.

Colher as frutas dos pomares e no Minguante secá-la. Colher as cebolas.

Colheita de rosas e flores.

Outros trabalhos:

Preparar o terreno para as sementeiras e plantações do próximo Outono.

Regar pela fresca e sachar.

Limpar os morangueiros, cortando-lhes os estolhos ou deixando só os necessários para a multiplicação.

Fazer a sulfatação e enxofra dos tomateiros.

Continuar a desfolha progressiva e sempre moderada dos pessegueiros.

Enxertar ameixieiras, cerejeiras, damasqueiros, macieiras, pereiras e pessegueiros.

Regar os pomares de citrinos e das plantações novas, e sachar as caldeiras (covas) no dia seguinte, cobrindo-as com palha ou erva seca.

Sachar e regar as áreas a milho. Mondar os arrozais.

Continuar os trabalhos indicados para julho, cavando e sachando frequentemente as hortaliças e regando, quando é possível, abundantemente antes das sementeiras e das transplantações.

Durante o mês corrente não pode haver faltas de atenção com a rega, evitando-se que as plantas sofram com a sede. No entanto, o excesso de água é altamente prejudicial.

Mudar as cinerárias e amores-perfeitos e regar as roseiras para darem melhores flores no Outono.

Executar a desparra, na vinha, que não deve ser excessiva, para que a maturação das uvas se faça nas melhores condições. Não deixar de tratar e inspecionar os excertos, amarrando-os, esladroando-os e, até se necessário, regando-os. Manter, ainda, a vigilância contra a possível ocorrência de ataques do míldio e do oídio, prosseguindo com os tratamentos adequados.

O material destinado às vindimas deve ser esfregado, raspado a seco e lavado, primeiramente, com uma solução fervente de carbonato de sódio a 10% e, depois, com água fria.

As vasilhas novas, para se evitar o gosto à madeira, devem ser "avinhadadas", lavando-as com uma solução de cloreto de sódio (sal das cozinhas) a 10%.

Nos animais, complementar a forragem com suplemento alimentar.

Embalagens Valorfito a recolher:

Procedimento para embalagens rígidas de capacidade superior a 250l/kg (Ex: bilha, bidão, tambor etc.):

Estas estão excluídas do sistema Valorfito; devem ser devidamente esgotadas do seu conteúdo e o utilizador deve contactar a empresa detentora da autorização de venda que lhe dará indicações sobre a gestão destes resíduos.

Procedimento para embalagens rígidas de capacidade inferior a 25l/kg (Ex: frasco, bilha, etc.):

As embalagens devem ser devidamente esgotadas do seu conteúdo, sujeitas à tripla lavagem e inutilizadas.

Guardar as embalagens nos sacos de recolha, para entrega posterior num Centro de Receção Valorfito.

Procedimento para embalagens não rígidas de qualquer capacidade (Ex: saco, saqueta, etc.):

As embalagens devem ser devidamente esgotadas do seu conteúdo e inutilizadas sem lavagem prévia.

Guardar as embalagens nos sacos de recolha, para entrega posterior num Centro de Receção Valorfito.

setembro

“Setembro molhado, figo estragado.”



O que se deve semear ou plantar:

Semear: agriões, alfaces, azedas, beldroegas, cebolas, cenouras, chicórias, coentros, couve-flor, repolho, ervilhas, espinafres, favas, nabos, rabanetes, salsa, segurelha, etc.

Enterram-se os bolbos das tulipas, narcisos e jacintos. Semeiam-se amores-perfeitos, assembleias, cravos dobrados, ervilha-de-cheiro, gipsófila, malmequeres anuais, malvaíscos, margaridas, miosótis, papoilas, etc.

O que se deve colher:

Colher sementes de quase todas as plantas, quer anuais, quer vivazes. Iniciar a vindima se os cachos já se encontrarem maduros.

Colher amêndoa e azeitona.

Colher milho e feijão.

Colher cebolas maiores para a semente.

Outros trabalhos:

Continuar a preparação dos talhões para as próximas sementeiras e plantações de Outono-Inverno, efetuando cavas fundas e procedendo ao enterramento do estrume e dos adubos.

Cuidar das hortaliças (brócolos, couve-flor, penca e repolho), que deverão ser estrumadas ou tapadas a meio do mês, se o não tiverem sido antes.

Prosseguir a enxertia a "olho dormente" de macieiras e pessegueiros, operação que convém ficar concluída em princípios de outubro.

Enxertar, "em fenda", cerejeiras, macieiras e pereiras de formas altas.

Aplicar caldas oleosas aos citrinos atacados por cochonilhas, desde que os frutos não tenham mais que 2cm de diâmetro.

Prosseguir com as lavouras de alqueiva e deslavre, iniciando-se as gradagens das terras para as sementeiras outono-invernais.

Fazem-se as últimas limpezas nas valas e abrem-se frenos naqueles locais onde se costumem verificar excessos de água durante o Inverno e a Primavera. Estes trabalhos são indispensáveis, pois não é possível cultivar terrenos demasiado húmidos, visto a humidade em excesso ser tão grande ou mesmo maior inimiga das plantas do que a seca.

Enterram-se os estrumes destinados às próximas sementeiras sachadas.

Proceder à preparação do terriço para aplicar nos canteiros dos jardins. Com os crisântemos tem-se cuidados especiais, como sejam a monda dos botões e a colocação de tutores. Estas operações são indispensáveis para a obtenção de bons exemplares de flores.

Dar início, nos pomares onde a colheita da fruta já estiver terminada, à poda e limpeza das árvores.

Desfolhar com cuidado se a maturação das uvas ainda estiver atrasada. Marcar, antes da colheita, as melhores cepas para o fornecimento dos garfos para as enxertias.


Embalagens Valorfito a recolher:

Instruções para a “Tripla Lavagem” - produtos fitofarmacêuticos com embalagem rígida até 25l/kg:

1. Vazar completamente o conteúdo da embalagem no tanque de pulverização;
2. Encher a embalagem com água até um quarto da sua capacidade;
3. Tapar e agitar vigorosamente durante alguns segundos;
4. Deitar água no tanque de pulverização;
5. Repetir mais duas vezes os passos 2 a 4.



outubro



“Em outubro pega tudo.”

O que se deve semear ou plantar:

Semear: ervilhas, favas, lentilhas, nabos, rabanetes, cenouras, espinafres (que se colhem pelo Natal), coentros, agriões, favas e ervilhas. Semear também, no jardim, amores-perfeitos, begónias, cravinas, ervilhas de cheiro, goivos, malmequeres, miosótis, papoilas, etc.

Plantar: espargos, couves, beterrabas, morangueiros e alhos.

Os alhos devem plantar-se cedo e agradecem uma boa adubação potássica. Plantar também, no jardim, açucenas, anémonas, cíclames, jacintos, junquinhos, lírios, narcisos, tulipas, etc.

Plantar árvores de fruto.

O que se deve colher:

Terminar as colheitas que não puderam ser concluídas em setembro: batata, feijão, milho, etc.

Continuar os trabalhos de vindima.

Colher a castanha, noz e avelã e, para guardar em local seco, abóboras e melões de Inverno.

Colher as flores do Outono: dalias, rosas, etc.

Iniciar a colheita da azeitona.

Outros trabalhos:

Prosseguir a preparação dos terrenos, cavando-os ou arando-os e estrumando-os abundantemente.

Defender as hortaliças contra a possível aparição de geadas, por meio de folhas secas, caruma, palha, feno, etc.

Continuar com a abertura de covas destinadas às plantações de Outono - Inverno; as covas devem permanecer abertas até à altura da plantação.

Proceder à estrumação e/ou adubação do pomar.



Inspecionar as enxertias.

Pulverizar os citrinos ou fruteiras de espinho com caldas cúpricas ou oleosas, conforme as pragas.

Proceder, logo que tenha ocorrido a queda das folhas, aos tratamentos contra a lepra e o pedrado nos pomares de pessegueiros.

Concluir a preparação das terras para as sementeiras de Outono/Inverno.

É aconselhável, à medida que se vai vindimando, marcar as cepas mais produtivas e sãs, que servirão para o fornecimento de garfos.

Fazer os vinhos brancos de consumo, verdes ou maduros, de bica aberta.

Trasfegar os vinhos tintos, especialmente os contidos em cubas de cimento, 15 dias após a encuba.

Vigiar as vasilhas e calafetá-las se verterem.

Este mês é favorável para a cobrição das porcas.

Cuidar da alimentação das frangas de uma ano, que iniciam a postura, fornecendo-lhes rações abundantes e equilibradas.

Proceder à iluminação artificial da capoeira, e colocar camas de palha.

Caiar as paredes da capoeira com cal branca, a que se adicionam produtos insecticidas para ter boas condições de sanidade.

Fazer duas vezes por dia a recolha de ovos, que devem ser conservados em lugar fresco, mas nunca sobre palha.


Vacinar os porcos contra doenças rubras e vacinar também os bovinos, caprinos, e ovinos.

Embalagens Valorfito a recolher:

Como e onde se devem armazenar os produtos fitofarmacêuticos?

O local onde se armazena os produtos fitofármacos deve estar fora do alcance de crianças e/ou animais.

Os produtos fitofármacos devem estar devidamente separados e isolados das sementes, produtos colhidos e fertilizantes.



novembro

“Cava fundo em novembro para plantares em janeiro.”



O que se deve semear ou plantar:

Semear: alface, beterraba, cebola, chicória, tomates, couve-galega, nabças de grelo, nabo redondo, rabanetes, ervilhas, favas, salsa, cereais de pravana (aveia, centeio, cevada, trigo) e de legumes (ervilha, fava).

Plantar: cerejeiras, pereiras, macieiras, batatas, nas áreas secas e, em terra bem repassada pelas chuvas, plantar barbados enxertados ou bravos.

O que se deve colher:

Continuar com a apanha da azeitona

Outros trabalhos:

Preparar os talhões e os canteiros destinados às sementeiras e plantações de Primavera. As estrumações são indispensáveis.

Desbastar os nabais, aproveitando o produto do desbaste para dar ao gado.

Proteger contra as geadas as plantas mais susceptíveis, com abrigos plásticos, esteiras, etc.

Manter vigilância, nos pomares de macieiras e pereiras, contra eventuais ataques de ácaros, cochonilhas e formiga.

Executar, nos pomares de pessegueiros, logo que se tenha verificado a queda da folha, os tratamentos contra o crivado e a lepra.

Proceder à abertura de valas, regos ou outras obras, que se considerem vantajosas para evitar a estagnação da água das chuvas.

Conservar o jardim limpo, procedendo à apanha da folhagem caída e aproveitando-a, juntamente com outros restos de plantas, ervas, detritos vários e cinzas, para o fabrico de "composto".

Podar roseiras e outros arbustos e depois pulverizam-se as roseiras com calda bordalesa a 1%.

Escavar para a retenção das águas das chuvas e das folhas caídas.



Abrir e limpar valas e regos para dar escoamento aos excessos de água durante o Inverno.

Começar a podar nos sítios menos frios.

Arejar a adega em dias calmos, para impedir o aparecimento de bolores ou maus cheiros, que podem tornar os vinhos defeituosos.

Inspecionar as vasilhas que estão com vinho novo, que se trasfega se já se apresentar limpo.

Atestam-se e abatocam-se as vasilhas.

Destila-se bagaço e água-pé, para obtenção de aguardente.


À base de feno, palha e grão, o gado bovino entra, em regime seco, devendo evitar-se uma brusca transição, a fim de fugir de perturbações digestivas.

Embalagens Valorfito a recolher:


Transporte de produtos fitofarmacêuticos

Os produtos fitofarmacêuticos devem ser transportados em compartimentos distintos dos passageiros, sempre que possível no exterior do veículo e afastados de alimentos e outras mercadorias. Os produtos devem estar seguros de forma a prevenir o seu movimento durante o transporte, utilizando por exemplo contentores fechados.

Não se devem colocar embalagens pesadas por cima de outras mais leves. Deve assegurar-se que as embalagens se encontram em boas condições.



dezembro



“Se queres bom alhal, semeia-o pelo Natal.”

O que se deve semear ou plantar:

Semear: cebola, couves, nabiças, rabanetes, espinafres, agriões, alfaces, favas, ervilhas, cenouras e os últimos trigos de Inverno.

No jardim, semear e/ou plantar açucenas, anémonas, angélicas, begónias, camélias, cíclames, gladiólos, goivos, jacintos, lilases, lírios, tulipas, etc.

Plantar: chicórias, couves diversas (nomeadamente repolho e couve-flor), estolhos de morangueiros, alhos e cebolas.

Continuar com a plantação de fruteiras de caroço e inicia-se a das de pevide.

O que se deve colher:

Colher couve-repolho e cebola. Fim da apanha da azeitona.

Outros trabalhos:

Preparam-se talhões e canteiros para as culturas próprias da época e, também, para as da próxima Primavera.

A terra tem de ficar bem afogada e sem torrões, incorporando-se nessa altura o estrume, que convém não estar completamente curtido, no caso de se tratar de canteiros destinados às culturas de Primavera.

Iniciam-se os tratamentos de Inverno, que continuam a ter o seu papel bem definido, não obstante a existência de insecticidas que podem usar-se na Primavera e que têm, por assim dizer, efeitos duplos.

Às laranjeiras que apresentam frutos já amarelos aplica-se calda cúprica a 2%.

Continuar as lavras nos campos com a incorporação de estrumes e corretivos, e proceder a outras atividades relacionadas com a preparação das terras para as sementeiras da Primavera.

Prosseguir a preparação dos canteiros e continuar o fabrico de "composto", iniciados no mês anterior.

Continuar a podar as vinhas já despidas de folhagem, reservando para enxertia ou mergulhando as vides sãs com produção mais regular.

Proceder à fertilização e meter mato nas entrelinhas das vinhas cansadas, de preferência polvilhado com gesso ou cal.

Proceder à trasfega para eliminar as borras nas adegas.

Continuar o arejamento da adega e todos os outros cuidados enunciados no mês anterior.

Abrigar o gado do frio e da chuva.

Matar de porcos.

Manter a capoeira limpa, abrigada das correntes de ar e da humidade.

Proteger os bebedouros e provê-los de água morna nos dias mais frios.

Cuidar dos coelhos em lactação, fornecendo-lhe aveia e algumas verduras.

Efetuar a separação, consoante os sexos, dos láparos já desmamados.

Embalagens Valorfito a recolher:

Não se esqueça, recolher as embalagens dos produtos valorfito está a ajudar o planeta e está, conseqüentemente a ajudar-se a si e aos que lhe são mais próximos.

